



Maliny, jeżyny,
porzeczki, agrest

Nawożenie dolistne

**Agroleaf[®]
Power**



Efekty widoczne już następnego dnia!

- najwyższa koncentracja składników pokarmowych,
- dostępność niezbędnych makro i mikroelementów dostosowanych do uprawy i fazy wzrostu,
- wysoka czystość chemiczna - bezpieczeństwo i skuteczność stosowania,
- nawozy bezchlorkowe,
- ograniczenie kumulacji szkodliwych azotanów w glebie,
- doskonała rozpuszczalność nawet w zimnej wodzie,
- formuła M77 zapewniająca lepsze przenikanie substancji odżywczych do wnętrza roślin i dłuższe utrzymywanie się preparatu na powierzchni liści.



Fertygacja – nawożenie kroplowe

**Solinure[®]
GT**



Wszystko w jednym - niezawodne

- nawozy bezchlorkowe z minimalną zawartością mocznika,
- zawierają magnez i pakiet schelatowanych mikroelementów.



Zalecenia nawozowe - nawożenie dolistne

Agroleaf Power: maliny, jeżyny, porzeczki i agrest

Faza produkcji	Agroleaf Power	Dawka kg/ha	Liczba zabiegów	Częstotliwość zabiegów
Początek wegetacji	High N – azotowy 31-11-11 + mikro*	3-4	1-2	Co 7 dni
Wzrost wegetatywny	Total – zrównoważony 20-20-20 + mikro*	4	1-2	Co 7-10 dni
Zawiązywanie pąków kwiatowych, kwitnienie	High P – fosforowy 12-52-5 + mikro*	4	2	Co 7 dni
Po kwitnieniu (malina i jeżyna)	Total – zrównoważony 20-20-20 + mikro*	4	2	Co 7-10 dni
Od zawiązania owoców do zbioru – przemienne	High K – potasowy 15-10-31 + mikro*	4 (malina, jeżyna) 5 (porzeczka, agrest)	2-3	Co 10-14 dni
	Calcium – wapniowy 11-5-19 + 9CaO + 2.5MgO + mikro**	4	2	Co 10-14 dni
Po zbiorach (do końca sierpnia)	High K – potasowy 15-10-31 + mikro*	4	1	-----

*mikroelementy: Fe 0.14, Mn 0.07, B 0.03, Cu 0.07, Mo 0.001, Zn 0.07 **mikroelementy: Fe 0.25, Mn 0.13, B 0.04, Cu 0.03, Mo 0.02, Zn 0.03

Zalecenia nawozowe - fertygacja

Solinure GT: maliny, jeżyny

Faza produkcji	Malina letnia (owocująca na pędach dwuletnich), jeżyna			Malina jesienna (owocująca na pędach jednorocznych)		
	Liczba dni wyk. zabiegu	Solinure GT	Dawka/ha/tydz.	Liczba dni wyk. zabiegu	Solinure GT	Dawka/ha/tydz.
Początek wegetacji	15	7 18-11-11 + 2MgO + mikro	20 kg	15	7 18-11-11 + 2MgO + mikro	15 kg
Wzrost wegetatywny	25-40	5 20-20-20 + mikro	30-40 kg	25-40	5 20-20-20 + mikro	30-40 kg
Od kwitnienia do zbiorów	35-40	1 10-5-39 + 2 MgO + mikro	30 kg	50-60	1 10-5-39 + 2 MgO + mikro	25 kg
Koniec zbiorów	25	2 7-19-38 + 2 MgO + mikro	15 kg	45	2 7-19-38 + 2 MgO + mikro	15 kg

Solinure GT: porzeczki, agrest

Faza produkcji	Solinure GT	Dawka/ha/tydz.
Początek wegetacji	7 18-11-11 + 2MgO + mikro	15 kg
Od początku kwitnienia do opadania płatków	5 20-20-20 + mikro	25 kg
Od opadania płatków do dojrzewania owoców	1 10-5-39 + 2 MgO + mikro	25 kg
Koniec zbiorów i do 4 tygodni po zbiorach	2 7-19-38 + 2 MgO + mikro	12 kg

Mikroelementy w nawozach Solinure GT: B 0.01, Cu 0.002, Fe 0.04, Mn 0.01, Mo 0.002, Zn 0.002



Ze względu na to, że nasze produkty są stosowane w zróżnicowanych warunkach uprawy i pozostają poza naszą kontrolą, firma Everris nie ponosi odpowiedzialności za negatywne wyniki ich stosowania. Wszystkie zabiegi powinny być wykonywane w oparciu o aktualną analizę podłoża i wody.

Everris

ICL Polska sp. z o.o.
ul. Puławska 469, 02-844 Warszawa
tel.: 22 395 64 10, fax: 22 395 64 13
www.everris.pl

Zadzwoń po poradę:

Agnieszka Bober (region centralny) 694 236 208
Andrzej Miąsko (region południowy) 604 321 398
Jacek Szymioł (region zachodni) 603 800 069

